



Neues Coronavirus (COVID-19)

Verdachts-, Beprobungs- und Meldekriterien vom 28.10.2020

Gültig ab: 02.11.2020

Klinische Kriterien

Folgende Symptome sprechen für ein COVID-19:

- Symptome einer akuten Atemwegserkrankung (z. B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen) und/oder
- Fieber ohne andere Ätiologie und/oder
- Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns und/oder
- akute Verwirrtheit oder Verschlechterung des Allgemeinzustandes bei älteren Menschen ohne andere Ätiologie

Hinweis: COVID-19 kann sich ebenfalls mit anderen unspezifischen oder selteneren Symptomen¹ präsentieren.

Epidemiologische Kriterien

- Epidemiologischer Link: enger Kontakt (< 1,5 m während > 15 Minuten) zu einem bestätigten Fall oder Exposition im Zusammenhang mit einem COVID-19 Ausbruch.

Beprobungskriterien

Eine Testung auf COVID-19 ist empfohlen bei:

- **symptomatischen Personen**, welche eines der klinischen Kriterien erfüllen²
 - **PCR-Test** (Goldstandard)
 - Verwendung von **Antigen-Schnelltest** möglich, wenn alle folgenden 4 Kriterien erfüllt werden
 1. Symptombeginn vor weniger als 4 Tagen UND
 2. Nicht zu den besonders gefährdeten Personen³ gehörend UND
 3. Nicht im Gesundheitswesen mit direktem Patientenkontakt arbeitend UND
 4. Ambulante Behandlung
- **nicht-symptomatischen Personen: Testung durch Antigen-Schnelltest oder PCR-Test**
 - **Im Rahmen einer Ausbruchsuntersuchung und –kontrolle** gemäss den Empfehlungen des BAG, angeordnet durch eine Ärztin/einen Arzt
 - **Nach einer Meldung einer Begegnung mit einem COVID-19 Fall durch die SwissCovid App.** Ein einziger Test sollte frühestens ab dem 5. Tag nach Kontakt erfolgen⁴.

Kantonsärztinnen und Kantonsärzte können auch **serologische Tests** anordnen.

Meldekriterien

- **Diagnostizierende Laboratorien** melden:
 - **die mittels PCR oder SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest nachgewiesenen positiven Befunde** innerhalb von 2 Stunden an das Kantonsarztamt und das BAG
 - **die mittels PCR oder SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest nachgewiesenen negativen Befunde** innerhalb von 24 Stunden an das BAG

¹ Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, allgemeine Schwäche, Schnupfen, Magen-Darm-Symptome (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen), Hautausschläge (z. B. Pseudo-Frostbeulen, urtikarielle, vesikuläre oder morbilliforme Exantheme)

² Die genannten anderen, selteneren und unspezifischen Symptome können nach klinischer Beurteilung ebenfalls einen PCR-Test oder einen SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest rechtfertigen. Für Kinder unter 12 Jahre gibt es andere Testindikationen (siehe [Empfehlung zum Vorgehen bei symptomatischen Kindern unter 12 Jahren sowie Testindikationen](#))

³ Hier finden Sie die aktuelle Definition der [«besonders gefährdeten Personen»](#).

⁴ Die Meldung der SwissCovid-App zeigt das Datum des Kontakts an. Ein negativer PCR-Test und insbesondere ein negativer Sars-CoV-2-Antigen-Schnelltest schliesst eine Infektion nicht aus, aber ein positiver Test ermöglicht es, die Übertragungsketten schneller zu unterbrechen. Der Test soll nicht wiederholt werden, wenn die Person asymptomatisch bleibt; sollte die Person eines der klinischen Kriterien inklusive der genannten anderen unspezifischen oder selteneren Symptomen (s. Fussnote 1) entwickeln, ist ein weiterer Test gemäss Algorithmus vorgesehen.



- **die Statistik der mittels Serologie nachgewiesenen positiven und negativen IgG Befunde** der vergangenen Kalenderwoche stratifiziert nach Wohnkanton am Montag an das BAG
- **Diagnostizierende Arztpraxen, Apotheken, Testzentren, Spitäler melden:**
 - **Die mittels SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest nachgewiesenen positiven Befunde** innerhalb von 2 Stunden an das BAG
 - **die mittels SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest nachgewiesenen negativen Befunde** innerhalb von 24 Stunden an das BAG
- **Ärztinnen und Ärzte** melden innerhalb von 24 Stunden an das Kantonsarztamt und das BAG:
 - **klinische Befunde von Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen sowie anderen sozialmedizinischen Institutionen mit bestätigter COVID-19 Diagnose** mittels PCR oder SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest
 - **klinische Befunde von hospitalisierten Personen** mit:
 - **bestätigter COVID-19 Diagnose** mittels PCR oder SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest oder
 - **erfüllten klinischen Kriterien und CT-Scan vereinbar mit COVID-19** auch mit **negativer PCR** und keiner anderen bekannten Ätiologie oder
 - **erfüllten klinischen und epidemiologischen Kriterien** auch mit **negativer PCR** und keiner anderen bekannten Ätiologie
 - **klinische Befunde von verstorbenen Personen** mit:
 - **bestätigter COVID-19 Diagnose** mittels PCR oder SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest oder
 - **erfüllten klinischen Kriterien und CT-Scan vereinbar mit COVID-19** oder
 - **erfüllten klinischen und epidemiologischen Kriterien**